

Ciências Exatas – Química

DESENVOLVIMENTO DE KIT PORTÁTIL PARA AVALIAÇÃO DE FERTILIDADE EM SOLOS

Bruno Silva Santos

IF BAIANO CAMPUS SANTA INÊS

Estudante do IF Baiano Campus Santa Inês. E-mail: brunosilvasantos_bruno@hotmail.com

Greice Quele da Conceição Oliveira

IF BAIANO CAMPUS SANTA INÊS

Estudante do IF Baiano Campus Santa Inês. E-mail: quele24@outlook.com

Marília Almeida dos Santos

IF BAIANO CAMPUS SANTA INÊS

Estudante do IF Baiano Campus Santa Inês. E-mail: marasantossss775@gmail.com

Luana Stephanie Sousa da Silva

IF BAIANO CAMPUS SANTA INÊS

Estudante do IF Baiano Campus Santa Inês. E-mail: luanastephanies.s.ls@gmail.com

Valdinei Santos de Souza

IF BAIANO CAMPUS SANTA INÊS

Docente do IF Baiano Campus Santa Inês. E-mail: valdinei.souza@ifbaiano.edu.br

RESUMO: Para que haja um melhor aproveitamento do potencial do solo e melhor rendimento na produção agrícola é de suma importância conhecer a qualidade do solo através de análises físico-químicas. A avaliação da fertilidade do solo possibilita escolher técnicas assertivas de manejo em um ambiente complexo reforçando práticas sustentáveis na comunidade agrícola. Dessa forma, elaborou-se um *kit* analítico portátil de baixo custo que viabiliza análises químicas do solo para finalidade de fertilidade. Análise dos parâmetros de pH do solo e cátions trocáveis (Al^{3+} , Ca^{2+} e Mg^{2+}), foram realizadas com adaptações nas metodologias empregadas pela Embrapa (2017). A identificação da medida potenciométrica de H^+ foi substituída pelo método colorimétrico, com uso de extratos vegetais indicadores ácidos – base. A determinação de Al^{3+} , Ca^{2+} e Mg^{2+} , realizada por volumetria de neutralização e complexação na metodologia preconizada pela Embrapa, foi adaptada para determinação por frasco conta-gotas realizando as adequações nos volumes de amostra e concentração das soluções titulantes. Os resultados mostraram que extratos de repolho roxo e pétalas de hibisco

TEMA:

DIÁLOGO INTERCULTURAL: Entre vivência e ciência

Palestras, Oficinas, Minicursos e Apresentações de trabalhos.

LOCAL: Auditório da biblioteca do Campus Santa Inês



aconditionadas em meio salino foram aplicados com sucesso na identificação das faixas de pH em extrato de solos. Um frasco conta-gotas foi empregado para substituir a bureta graduada. A avaliação do volume de cada gota dispensada pelo frasco dosador foi determinada por ensaio com 9 repetições e 3 operadores. O volume encontrado por gota foi de $(51,3 \pm 3,8) \mu\text{L}$. Na determinação de cátions trocáveis pela metodologia padrão foram encontrados os valores de $(0,19; 0,67) \text{ cmolc.kg}^{-1}$ para os teores de Al^{3+} , $(0,92; 3,40) \text{ cmolc.kg}^{-1}$ para os teores de Ca^{2+} e $(4,17; 3,15) \text{ cmolc.kg}^{-1}$ para os teores de Mg^{2+} . Para as mesmas amostras utilizando a metodologia proposta pelo *Kit* portátil, os valores foram respectivamente $(0,20; 0,59)$, $(0,75; 3,49)$, $(3,98; 3,0) \text{ cmolc.kg}^{-1}$ para Al^{3+} , Ca^{2+} e Mg^{2+} . Ao nível de confiança de 95% os resultados encontrados nas amostras de solo não se diferem nos seus valores quando comparados com a metodologia adaptada para o *Kit* e a metodologia da Embrapa 2017. Desta forma, o desenvolvimento do *Kit* portátil se apresenta como uma alternativa de grande potencial para fornecer análises químicas de solos de forma rápida, confiável e muito barata. Futuramente pretende-se ampliar as possibilidades de análises e incorporar ao *kit* novos parâmetros de avaliação bem como, desenvolver um aplicativo de celular para auxiliar no uso do *kit* e fornecer os resultados de forma clara e com linguagem apropriada para um público geral de conhecimento não técnico.

Palavras-chave: Solo. Fertilidade. Análise.

REFERÊNCIAS

EMBRAPA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Manual de métodos de análise de solo**. 3. ed. rev. e ampl. Brasília, DF: Embrapa, 2017. 574 p.

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/181717/1/Manual-de-Metodos-de-Analise-de-Solo-2017.pdf>